

Apdorojamas pasėlis	Kenksmingi organizmai	Apdoravimo laikas, dozės, pastabos
Vynuogės *	Tikroji miltligė (<i>Uncinula necator</i>)	Purkšti profilaktiškai, kai susidaro palankios sąlygos infekcijai plisti ir yra užsikrėtimo pavojus. Purškiama išsiskleidus antram lapui iki uogų brandos (BBCH 12-85). Norma: 30 g/100 m ² , skiedžiant 4 l vandens / 100 m ² . BBCH 61 (žydėjimo pradžia) 60 g/100 m ² , skiedžiant 8 l vandens / 100 m ² . BBCH 71 (vaisių vystymosi pradžia) 90 g/100 m ² , skiedžiant 12 l vandens / 100 m ² . BBCH 75 (uogos žirnio dydžio, formuojasi kekės) 120 g/100 m ² skiedžiant 16 l vandens / 100 m ² . Didžiausias purškimų skaičius 6. Intervalai tarp purškimų 3-7 dienos. Laikotarpis iki derliaus nuėmimo: 1 diena.
Obelys, kriaušės, svarainiai *	Rauplės (<i>Venturia spp.</i>)	Purkšti profilaktiškai, kai susidaro palankios sąlygos infekcijai plisti ir yra užsikrėtimo pavojus. Purškimo laikas nuo tada, kai atsiskiria pirmieji lapai iki kol vaisiai įgauna jiems būdingą spalvą (BBCH 10 – 85). Norma: 25 g/100 m ² 1 m lajos aukščio, skiedžiant 5 l vandens / 100 m ² 1 m lajos aukščio. Didžiausias purškimų skaičius 6. Intervalai tarp purškimų 3-7 dienos. Jautrioms veislėms gali atsirasti pažeidimų ant vaisiaus odelės. Nemaišyti su vario turinčiais preparatais. Laikotarpis iki derliaus nuėmimo: 1 diena.
Obelys, kriaušės, svarainiai, juodosios aronijos *	Vaisių puviniai (<i>Gloeosporium spp.</i>)	Purkšti profilaktiškai nuo BBCH 74 iki 87 (vaisių dydis apie 40 mm iki visiškos vaisių brandos – vaisiai tinkami skynimui). Norma: 25 g / 100 m ² 1 m lajos aukščio. 5 l vandens / 100 m ² 1 m lajos aukščio. Didžiausias purškimų skaičius 6. Intervalai tarp purškimų 3-7 dienos. Laikotarpis iki derliaus nuėmimo: 1 diena.
Braškės lauke ir šiltnamyje *	Pilkasis (kekerinis) puvinys (<i>Botrytis cinerea</i>)	Purkšti profilaktiškai, kai susidaro palankios sąlygos infekcijai plisti ir yra užsikrėtimo pavojus, nuo žydėjimo pradžios iki uogų auginimo pabaigos (BBCH 59 -89). Norma: 50 g / 100 m ² skiedžiant 20 l vandens / 100 m ² Didžiausias purškimų skaičius 6. Intervalai tarp purškimų 3-7 dienos. Laikotarpis iki derliaus nuėmimo: 1 diena.
Gudobelės, cidonijos, raugerškiai, mėlynės, spanguolės, šilauogės, serbentai, šaltalankiai, šėivamedžiai, agrastai *	Pilkasis (kekerinis) puvinys (<i>Botrytis cinerea</i>)	Purkšti profilaktiškai, kai susidaro palankios sąlygos infekcijai plisti ir yra užsikrėtimo pavojus. Purškimo laikas nuo žydėjimo pradžios iki uogų auginimo pabaigos (BBCH 59 - 89). Norma: 50 g /100 m ² , skiedžiant 10 l vandens /100 m ² . Didžiausias purškimų skaičius 6. Intervalai tarp purškimų 3-7 dienos. Laikotarpis iki derliaus nuėmimo: 1 diena.
Avietės, gervuogės lauke ir šiltnamyje *	Pilkasis kekerinis puvinys (<i>Botrytis cinerea</i>)	Purkšti profilaktiškai, kai susidaro palankios sąlygos infekcijai plisti ir yra užsikrėtimo pavojus. Purškimo laikas nuo žydėjimo pradžios iki uogų auginimo pabaigos (BBCH 59 - 89). Norma: 50 g /100 m ² , skiedžiant 10 l vandens /100 m ² . Didžiausias purškimų skaičius 6. Intervalai tarp purškimų 3-7 dienos. Laikotarpis iki derliaus nuėmimo: 1 diena.
Salotos, cikorijs lauke ir šiltnamyje *	Tikroji miltligė (<i>Golovinomyces cichoracearum</i>)	Purkšti profilaktiškai, kai susidaro palankios sąlygos infekcijai plisti, pradedant nuo tikrojo lapo tarpinio iki kol pasėlis pasiekia būdingą dydį (BBCH 12–49). Norma: 30 g /100 m ² , skiedžiant 6 l vandens / 100 m ² Didžiausias purškimų skaičius 10. Intervalai tarp purškimų 3-7 dienos. Laikotarpis iki derliaus nuėmimo: 1 diena.
Ankštinės pupelės lauke ir šiltnamyje *	Pilkasis (kekerinis) puvinys (<i>Botrytis spp.</i>)	Purkšti profilaktiškai, kai susidaro palankios sąlygos infekcijai plisti ir yra užsikrėtimo pavojus, pradedant žiedpumpurių atsiradimu (BBCH 51). Norma: 25 g / 100 m ² , skiedžiant 6 l vandens / 100 m ² , jei augalo aukštis iki 50 cm. 37,5 g / 100 m ² , 9 l vandens / 100 m ² , jei augalo aukštis nuo 50 iki 125 cm. 50 g / 100 m ² , 12 l vandens / 100 m ² , jei augalo aukštis daugiau kaip 125 cm. Didžiausias purškimų skaičius 6. Intervalai tarp purškimų 3-7 dienos. Laikotarpis iki derliaus nuėmimo: 1 diena.
Pomidorai, baklažanai šiltnamyje *		
Agurkai, cukinijos, šiltnamyje *		
Melionai, arbūzai šiltnamyje *		
Agurkai, cukinijos, moliūgai lauke *	Pilkasis (kekerinis) puvinys (<i>Botrytis cinerea</i>)	Purkšti profilaktiškai, kai susidaro palankios sąlygos infekcijai plisti ir yra užsikrėtimo pavojus, pradedant žiedpumpurių atsiradimu (BBCH 51). Norma: 50 g / 100 m ² , skiedžiant 12 l vandens /100m ² . Didžiausias purškimų skaičius 6. Intervalai tarp purškimų 3-7 dienos. Laikotarpis iki derliaus nuėmimo: 1 diena.
Smidrai lauke *	Pilkasis (kekerinis) puvinys (<i>Botrytis cinerea</i>)	Purkšti profilaktiškai arba pastebėjus pirmuosius infekcijos požymius. Naudoti jaunų augalų plotuose ir derančiuose laukuose po derliaus nuėmimo. Norma: 50 g / 100 m ² , skiedžiant 100 l vandens/100m ² . Didžiausias purškimų skaičius 6. Intervalai tarp purškimų 3-7 dienos.
Svogūnai, laiškinių svogūnai, česnakai, tuščialaiškiai česnakai lauke *	Pilkasis (kekerinis) puvinys (<i>Botrytis spp.</i>)	Purkšti profilaktiškai arba pastebėjus pirmuosius infekcijos požymius. Naudoti jaunų augalų plotuose ir derančiuose laukuose po derliaus nuėmimo. Norma: 50 g / 100 m ² , skiedžiant 10 l vandens /100m ² .

		Didžiausias purškimų skaičius 6. Intervalai tarp purškimų 3-7 dienos. Laikotarpis iki derliaus nuėmimo: 1 diena.
Prieskoniniai augalai lauke ir šiltnamyje *	Tikroji miltligė	Puršksti profilaktiškai arba pastebėjus pirmuosius infekcijos požymius. Norma: 30 g / 100 m ² , skiedžiant 6 l vandens / 100 m ² . Didžiausias purškimų skaičius 10. Intervalai tarp purškimų 3-7 dienos. Laikotarpio iki derliaus nuėmimo nėra.
Dekoratyviniai augalai lauke ir šiltnamyje *	Tikroji miltligė (<i>Uncinula bicornis</i> , <i>Microsphaera alphitoides</i> , <i>Sphaerotheca macularis</i>)	Puršksti profilaktiškai arba pastebėjus pirmuosius infekcijos požymius. 25 g / 100 m ² , skiedžiant 5-10 l vandens / 100 m ² , augalams iki 50 cm aukščio. 37,5 g / 100 m ² , 10-15 l vandens / 100 m ² , augalams nuo 50 cm iki 125 cm aukščio. 50 g / 100 m ² , 15-20 l vandens / 100 m ² , augalams, kurių aukštis didesnis nei 125 cm. Didžiausias purškimų skaičius 10. Intervalai tarp purškimų 3-7 dienos. Laikotarpio iki derliaus nuėmimo nėra.
Spygliuočių ir lapuočių sodmenys medelynuose *	Tikroji miltligė (<i>Uncinula bicornis</i> , <i>Microsphaera alphitoides</i>)	Puršksti profilaktiškai arba pastebėjus pirmuosius infekcijos požymius. 25 g / 100 m ² , skiedžiant į 5-10 l vandens / 100 m ² , augalams iki 50 cm aukščio. 37,5 g / 100 m ² , į 10-15 l vandens / 100 m ² , augalams nuo 50 cm iki 125 cm aukščio. 50 g / 100 m ² , į 15-20 l vandens / 100 m ² , augalams, kurių aukštis didesnis nei 125 cm. Didžiausias purškimų skaičius 10. Intervalai tarp purškimų 3-7 dienos. Laikotarpio iki derliaus nuėmimo nėra.

Tirpalas ruošiamas prieš pradant apdorojimo augalų apsaugos produktais darbus. Prieš pradant ruošti tirpalą, įsitikinkite, kad purkštuvus yra kruopščiai išplautas, ypač jei jis buvo naudotas kitiems augalams puršksti. Tiksliai nustatykite rei